

BROMATOP

APPÂT RATICIDE PRÊT À L'EMPLOI

AMM FR-2014-0091

- *Utilisé pour la destruction des rongeurs nuisibles (rats noirs, mulots, souris).*
- *N'éveille aucune méfiance des rongeurs vis-à-vis de l'appât.*
- *Présente la particularité d'être efficace contre les rongeurs résistants.*

UTILISATIONS :

Le BROMATOP est destiné à être utilisé à l'intérieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles et aux abords des infrastructures contre les rats et les souris domestiques. Le produit ne doit être utilisé que dans des postes d'appâtage.

Dose(s) et fréquence(s) d'application :

Contre les rats: 60g à 100g de produit tous les 100m².

Contre les souris: 40g de produit tous les 100m².

MODE D'EMPLOI :

Adapter le nombre de sachets préconisés par poste d'appâtage à la dose efficace recommandée et respecter les intervalles d'application du produit.

Le nombre de postes d'appâtage est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Le nombre de sachets disposés par poste d'appâtage doit être adapté aux doses d'applications validées.

Les postes doivent être placés le long des chemins empruntés par les rongeurs et dans les endroits les plus fréquentés. Inspecter et réapprovisionner les postes d'appâtage durant la période de traitement, trois jours après application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé.

Délai nécessaire pour l'apparition de l'effet biocide : entre 2 et 4 jours après ingestion de l'appât.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Support : Pâte.

Biocide TP14

Composition : Rodenticide anticoagulant

Matière active : Bromadiolone - Taux de matière active : 0.005 %

Mode d'action : Par ingestion répétée - Anticoagulant

Conditionnement : Carton de 10 kg / Seau de 5 kg

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Ne pas manger, ne pas fumer et ne pas boire pendant l'utilisation. Ne pas disposer sur des surfaces et des ustensiles qui pourraient être en contact avec les aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale. Les postes doivent être placés de manière sûre afin de minimiser les risques d'accès au produit et d'ingestion par des enfants ou des animaux non cibles. Les postes d'appâtage ne doivent pas être utilisés pour contenir d'autres produits que des rodenticides. Ne pas appliquer le produit directement dans les terriers. Le port de gants conformes à la réglementation est obligatoire. Le référentiel technique à suivre est la norme NF EN 374 (partie 1,2 et 3). Ne pas ouvrir les sachets. Se laver les mains après utilisation. Retirer tous les postes d'appâtage après la fin du traitement. Alternier les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents afin d'éviter l'apparition de phénomènes de résistance. Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique, mesure d'hygiène. Vérifier l'efficacité du produit sur site : le cas échéant, les causes de diminution de l'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer de l'absence de résistance. Ne pas utiliser le produit dans des zones où les cas de résistance sont suspectés ou établis. Prévenir le responsable de la mise sur le marché en cas de non efficacité du traitement ou de signes pouvant être interprétés comme un développement de résistance. Indication à reporter sur les postes d'appâtage, à destination des personnes autres que l'utilisateur : Ne pas ouvrir le poste d'appâtage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Le produit ne peut être utilisé que dans des boîtes d'appât sécurisées. Les postes doivent être placés de manière sûre pour minimiser les risques d'accès au produit et d'ingestion par des enfants ou des animaux non cibles. S'assurer que les boîtes sont correctement fermées pour éviter que les appâts ne soient sortis des postes par les rongeurs. Ne pas disposer sur des surfaces et des ustensiles qui pourraient être en contact avec les aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale. Ne pas nettoyer les postes d'appâtage entre 2 applications. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. Ne pas rejeter le produit dans l'environnement ou les canalisations. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. Collecter les appâts non consommés, les débris entraînés hors des boîtes et stations d'appâtage et les rongeurs morts. Déposer les postes d'appâtage usagés et les appâts non consommés en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié. Les postes d'appâtage ne doivent pas être utilisés pour contenir d'autres produits que les rodenticides. Retirer tous les postes d'appâtage après la fin du traitement.

Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles